

## BOBAL



Considerada autóctona de la zona de Requena (también se podía encontrar en Sagunto), su antigüedad se remonta, por lo menos, a la Edad Media. Esta uva es típica de las zonas altas de Levante. Predomina en el viñedo de la región valenciana de Utiel Requena, donde representa más del 90% de la superficie cultivada. Corresponde a la variedad autorizada en las denominaciones de origen de Alicante, Cariñena y Utiel - Requena.

**Caracteres ampelográficos:** pámpano de ápice verde bronceado, de porte semierguido y horizontal. Hoja media-grande, pentagonal, haz verde oscuro y envés algodonoso con 5 lóbulos sobrepuestos a nivel del seno peciolar en V. Racimo medio-grande de forma cónica e irregular. Baya esferoidal de dimensiones medianas, ligeramente aplastada.

**Aptitudes de cultivo:** cepa de buen vigor y buena resistencia a las sequías. Brota un poco más tarde que otras variedades, con lo que se evita el riesgo de las heladas primaverales. Durante primaveras muy frías, puede dar lugar a enrojecimientos de la hoja y caídas de la producción y fertilidad, debido a su elevado vigor.

**Formación y poda:** se adapta a varias formas de poda, prefiriendo aquellas largas por su poca fertilidad basal.

**Época de brotación:** media-tardía.

**Época de maduración:** media-tardía.

**Producción:** elevada.

**Sensibilidad a las enfermedades y adversidades:** media a oídio. A pesar de tener un racimo grande y compacto, se ha demostrado que es más resistente a las enfermedades que las variedades como el Tempranillo, tanto en la piel de la baya, más espesa, como por el follaje más aireado.

**Potencial enológico:** grado alcohólico relativamente bajo y de acidez elevada (5,5 a 6,5 de tartárico). Sus vinos se caracterizan por un intenso color cereza oscuro con ribetes de color granate violáceo. En la nariz, aparecen matices ligeramente herbáceos. En la boca, resaltan los taninos y la acidez. Se emplea también para la elaboración de rosados, bastante finos y afrutados y de sabor fresco. Sus vinos son poco aptos para la crianza, han sido y siguen siendo considerados el componente ideal para mejorar el color de otros vinos más flojos.



### SUPERFICIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO	1990	1999	2009
HECTÁREAS	105.774	104.372	78.145

Viñedos en Castilla-La Mancha

