

## CRIMSON SEEDLESS

Variedad obtenida en USDA-FRESNO en California, mediante cruce entre Emperor con C33-199.



**Caracteres ampelográficos:** ápice de color verde con bordes marrones o rosa, sin vello. Hoja mediana, eptalobulada, sin vello de color verde claro brillante. Seno peciolar en lira cerrada con bordes sobrepuestos. Superficie inferior sin vello. Racimo medio, piramidal con bayas bien separadas. Baya mediana-pequeña, ovalada, medianamente resistente de color rojo purpúreo con pulpa crujiente y sabor neutro.

**Características fenológicas y agronómicas:**

Época de brotación: media.

Época de maduración: tardía.

Vigor: elevado.

Fertilidad real: 0.96.

Producción: limitada.

Peso racimo: 400-500 g.

Peso baya: 4-5 g.

Pepitas: ausentes.

Contenido azúcar: 17.5%.

Acidez total: 6.10‰.

PH: 3.5.

Resistencia al transporte: elevada.

**Formación y poda:** cepa muy vigorosa; requiere formas expandidas y podas largas; óptimo para los ambientes cálidos. Requiere defoliación para una mejor iluminación y, así, una mejor coloración de los racimos que, a veces, es deficiente.

**Sensibilidad a las enfermedades y adversidades:** dentro de la norma.

**Evaluación compleja:** racimo de un aspecto completamente apireno. Encuentra las mejores condiciones de cultivo en suelos pobres. Las incisiones anulares permiten obtener un importante incremento del peso de las bayas y un índice de separación más elevado, pero al mismo tiempo provocan un retraso de la maduración. Se recomienda recolectar en diferentes épocas para obtener color más uniforme.



Parral de Crimson Seedless en Puglia

