

## GODELLO

Variedad originaria de la ribera del río Sil, en Galicia. Es considerada variedad principal en las denominaciones de origen de Valdeorras y Bierzo. Se cultiva en Portugal con el nombre de Gouveio y, en algunas regiones hasta el año 2000, con el nombre de Verdelho (2.050 ha en el año 2000). Es distinta a la variedad Verdelho de Madeira.



**Caracteres ampelográficos:** pámpano de ápice abierto, de mediana pigmentación y densidad de pelos tumbados. Hojas pentaformes, de tamaño pequeño, pentalobuladas, de color verde oscuro. Racimo pequeño, corto, de compacidad mediana y forma cónica variable. Bayas de tamaño medio, elipsoidales.

**Aptitudes de cultivo:** cepa de vigor medio-alto, porte semierguido. Bastante resistente al estrés hídrico y térmico, evitar suelos húmedos y fértiles. Maximiza su potencial en climas secos, frente a aquellos más húmedos, donde incrementa su vigor y rendimiento, con el consiguiente descenso de la calidad.

**Formación y poda:** los mejores resultados se obtienen con podas a Guyot.

**Época de brotación:** media-temprana.

**Época de maduración:** media-temprana (7 días después del Albariño).

**Producción:** media.

**Sensibilidad a las enfermedades y adversidades:** sensible a oidio y botrytis y menos al mildiu y a la excoriosis. Sensible a las heladas primaverales.

**Potencial enológico:** proporciona vinos bien estructurados de acidez media-buena. Adecuada para la elaboración de vinos espumosos y de envejecimiento. Con aromas a manzana madura, poseen un elevado nivel de glicerol, lo cual les proporciona una agradable mezcla de acidez y dulzura. Sus vinos son de color amarillo pajizo, perfumados, duraderos en el tiempo y con cuerpo. Proporciona vinos de excelente calidad.

**Clones en multiplicación:** Clones portugueses: 121JBP, 122JBP.



### SUPERFICIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO	1990	1999	2009
HECTÁREAS	32	405	1.194

### SUPERFICIE CULTIVADA EN PORTUGAL:

AÑO	1989	2000	2011
HECTÁREAS	2.414	2.050	443

Viñedos en Bierzo (Castilla y León)

