

# LOUREIRA

*Variedad muy antigua, difundido en el noroeste de la península ibérica, especialmente en la región de Ribeira Lima, Portugal (5.200 ha en el año 2000) y en el sur de Galicia. Su nombre deriva del perfume a laurel de la uva y de las hojas. También conocida con el nombre de Marques.*



**Caracteres ampelográficos:** sumidad abierta, con pigmentación continua y vellosidad media. Pámpanos rojizos. Hoja media con seno peciolar en lira semicerrada, cinco lóbulos y bordes ligeramente curvados hacia el interior. Racimo grande, alado, medianamente compacto, de forma cilíndrica o cilíndrica-cónica. Baya media, esférica, de color amarillo dorado y pulpa jugosa.

**Aptitudes de cultivo:** vigor medio-elevado, porte semierguido. Prefiere suelos profundos de fertilidad mediana, algo secos. Es sensible a las carencias hídricas.

**Formación y poda:** se adapta a diversas formaciones, también de cordón y Guyot, gracias a su alta fertilidad (2 racimos/yema).

**Época de brotación:** media-precoc.

**Época de maduración:** medio-tardía (7 días después del Godello).

**Producción:** media-alta.

**Sensibilidad a las enfermedades y adversidades:** sensible a la botrytis, a la excoziasis y al oídio. Un poco menos sensible al mildiu.

**Potencial enológico:** proporciona vinos de acidez elevada, poco alcohólicos y notable aromaticidad. Adecuado para mezclas con otras variedades.

**Clones en multiplicación:** mezcla policlonal.



## SUPERFICIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO	1990	1999	2009
HECTÁREAS	25	25	503

## SUPERFICIE CULTIVADA EN PORTUGAL

AÑO	1989	2000	2011
HECTÁREAS	2.384	5.200	2.918

Nueva plantación con protectores en Vinho Verde (Portugal)

