

MACABEO



Variedad originaria de España, desde donde se propagó hacia la región francesa de Midi. Se cultiva en muchas zonas de España. Sus sinónimos son Macabeu y Viura.

Caracteres ampelográficos: pámpano de ápice con fuerte densidad de pelos tumbados. Hoja grande con cinco lóbulos muy marcados, pentagonal, seno peciolar en lira. Racimo grande y compacto. Baya redonda, mediana y de hollejo fino.

Aptitudes de cultivo: variedad vigorosa de porte erguido. Se adapta a todas las condiciones climáticas y de altitud, pero se cultiva mejor en suelos fértiles y frescos. Sensible al viento y las sequías extremas.

Formación y poda: funciona bien con podas cortas aunque admite podas largas, dependiendo de las condiciones pedoclimáticas. Un exceso de producción puede afectar notablemente la calidad.

Época de brotación: tardía.

Época de maduración: medio tardía.

Producción: elevada y constante.

Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: variedad sensible a las enfermedades de la madera, propensa a ataques de la botrytis en suelos húmedos y fértiles. Sensible al oídio, ácaros y al mildiu.

Potencial enológico: proporciona vinos de color amarillo pajizo, alcohólicos de buena acidez y aromas afrutados. Vinos poco astringentes, pero muy bien equilibrados en acidez – alcohol. Soporta bien la crianza en barricas. En España, se obtienen vinos de 10 a 11 grados, afrutados y frescos; resulta ideal para la elaboración de vinos jóvenes y como base para cava. En Francia, se utiliza, sobre todo, para la preparación de vinos generosos y licorosos en los Pirineos orientales y para vinos dulces naturales en Banyuls y Rivesaltes.

Clones en multiplicación: Macabeu (clones franceses): Inra-Entav 630, 631, 737; Viura (clones españoles): I-82, I-83, E-225.



SUPERFICIE CULTIVADA EN ESPAÑA

AÑO	1990	1999	2009
HECTÁREAS	37.759	44.781	34.896

SUPERFICIE CULTIVADA EN FRANCIA

AÑO	1958	1968	1979	1988	1998	2006
HECTÁREAS	4.429	5.975	7.077	7.621	5.771	3.536

Viñedos en Penedes (Cataluña)

