

TOURIGA NACIONAL

Variedad originaria del norte de Portugal, encuentra su máxima difusión en las regiones de Douro y Dão. Actualmente, se cultiva en todo Portugal. Muestra gran capacidad de adaptación a diversos ambientes. Está presente en Australia, en California y en varios países del Mediterráneo.

Caracteres ampelográficos: Pámpano de ápice abierto, verde blanquecino; hoja pequeña, pentagonal, con cinco lóbulos, dientes cortos y rectilíneos, seno peciolar abierto en "V". Racimo pequeño, cilindro-cónico, medianamente compacto, pedúnculo de longitud media. Baya mediana, ligeramente aplanada, piel de espesura media.

Aptitudes de cultivo: cepa de vigor medio-elevado y porte semirastrero. Se adapta bien a varios tipos de suelos, prefiriendo aquellos bien expuestos y climas cálidos. La floración es generalmente buena, pero muy sensible a los cambios climáticos y, por lo tanto, al corrimiento.

Formación y poda: se adapta a diversos sistemas de formación y poda, prefiriendo podas largas como el Guyot. En los primeros años, es importante no cargar demasiado la producción.

Época de brotación: precoz.

Época de maduración: media.

Producción: baja con materiales no seleccionados. Media-elevada con materiales clonales.

Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: no es particularmente sensible a las enfermedades típicas de la vid, como el oídio, el mildiu o la botrytis. En ciertas cosechas, puede sufrir corrimiento y pérdida de las bayas, especialmente en condiciones de estrés hídrico (marchitamiento de la planta).

Potencial enológico: proporciona vinos de mucho color, muy aromáticos e intensos, con un alto contenido tánico. Los aromas son finos y complejos, a veces salvajes, con un carácter afrutado intenso y a veces floral. Adecuado tanto para el consumo joven, como para el envejecimiento largo.

Clones en multiplicación: mezcla policlonal, 16JBP, 108JBP, 112JBP.



SUPERFICIE CULTIVADA EN PORTUGAL

AÑO	1989	2000	2011
HECTÁREAS	2.762	6.700	4.970

Viñedos en Douro (Portugal)

