

TRINCANDEIRA

Cepa autóctona cultivada en Portugal y también denominada Tinta Amarela.



Caracteres ampelográficos: pámpano de ápice abierto, verde amarillento, con ligera pigmentación antocianica. Hoja pentagonal, tri-pentalobulada, seno peciolar en V, cerrado con lóbulos sobrepuestos. Racimo mediano, medianamente compacto. Baya mediana, ovoide.

Aptitudes de cultivo: cepa de vigor elevado y porte semierguido. Se adapta a ambientes cálidos y suelos pobres y secos.

Formación y poda: de conducción no fácil, se adapta a varios sistemas de poda. En caso de podas largas, puede dar lugar a producciones excesivas.

Época de brotación: media-precoz.

Época de maduración: precoz.

Producción: elevada.

Sensibilidad a las enfermedades y adversidades: poco sensible al mildiu, muy sensible al oídio y la botrytis.

Potencial enológico: proporciona vinos de color granate intenso, de acidez media, ligeramente especiados y herbáceos que con el envejecimiento se convierten en aromas a fruta madura muy finos y complejos.

Clones en multiplicación: mezcla policlonal.



SUPERFICIE CULTIVADA EN PORTUGAL

AÑO	1990	2000	2011
HECTÁREAS	8.463	16.200	7.156

Viñedos en Douro (Portugal)

