

AUTUMN ROYAL

Ottenuta da David Ramming e Ron Tarailo dall'USDA-ARS di Fresno-California, 1981 dall'incrocio Autumn Black x C74-1.



Epoca di germogliamento: medio-tardiva.

Epoca di maturazione: tardiva.

Vigoria: buona.

Fertilità reale: 0,4.

Produzione: media, 25 T/Ha.

Indice di distacco: 544g.

Peso grappolo: 900/1200g.

Peso acino: 7 g.

Vinaccioli: apirena o con presenze erbacee.

Tenore zuccherino: 17 (°Brix).

Acidità totale: 5,2 (g/L).

PH: 3,87.

Gestione della vegetazione: nella norma.

Affinità con i portinnesti: buona con 1103 Paulsen, 110Ricter e Kober5bb. Scarsa su 140Ruggeri per iperplasia del punto d'innesto.

Attitudine alla conservazione: buona.

Resistenza ai trasporti: buona.

Caratteri ampelografici: grappolo molto lungo, di forma cilindrico o conico, mediamente compatto con 1-3 ali. Acino medio-grande, troncovoidale-ovoidale; buccia dal colore blu-nero. Polpa croccante ed incolore, dal sapore neutro.

Allevamento e potatura:

- Sistema di allevamento: la varietà si adatta bene alla pergola, con distanza d'impianto 2,5 x 2,5 m oppure 2,3 x 2,3 m;
- Potatura: lunga con almeno 15 gemme per capo a frutto, che vuol dire 60 gemme/pianta.

Sensibilità alle malattie e alle avversità: media.

