

## CRIMSON SEEDLESS

Varietà ottenuta presso l' USDA-FRESNO in California da un incrocio di Emperor con C33-199.



**Caratteri ampelografici:** apice di colore verde con bordi bronzati o rosa, glabro. Foglia media, eptalobata, glabra, di colore verde chiaro brillante. Seno peziolare a lira chiusa con bordi sovrapposti. Pagina inferiore glabra. Grappolo medio, piramidale con acini ben separati. Acino medio-piccolo, ovale, mediamente resistente, di colore rosso violaceo con polpa dolce croccante e gusto neutro.

**Caratteristiche fenologiche ed agronomiche:**

Epoca di germogliamento: media.

Epoca di maturazione: tardiva.

Vigoria: elevata.

Fertilità reale: 0,96.

Produzione: limitata.

Peso grappolo: 500 g.

Peso acino: 4-5 g.

Vinaccioli: assenti.

Tenore zuccherino: 17,5%.

Acidità totale: 6,10%.

PH: 3,5.

Resistenza ai trasporti: elevata.

**Allevamento e potatura:** vitigno molto vigoroso; richiede sistemi di allevamento elevati e potatura lunga; ottimo per gli ambienti caldi. Necessita di sfogliatura per avere una maggiore illuminazione e ottenere una migliore colorazione dei grappoli che a volte è carente.

**Sensibilità alle malattie e alle avversità:** nella norma.

**Giudizio complessivo:** grappolo di bell'aspetto completamente apireno. Nei terreni magri trova le migliori condizioni di coltivazione. Con l'incisione anulare si ottengono incrementi sensibili del peso delle bacche e un più elevato indice di distacco, però allo stesso tempo si ha un ritardo nella maturazione. È opportuno effettuare la raccolta in più riprese per raccogliere i grappoli con colore più uniforme.



**SUPERFICIE COLTIVATA IN ITALIA**

ANNO	1990	2000	2010
ETTARI	-	20	600

Tendone di Crimson Seedless in Puglia

